



Factsheet

SPREEUW

Eieren leggen	Broeden	Jongen vliegvlug na
4-6 dagen	11-13 dagen	19-24 dagen
<i>In totaal 34-43 dagen van eileg tot vliegend jong</i>		

KALENDER

De spreeuw is een sociale vogel die in Nederland jaarrond in groepen leeft.

Maart
Voorjaarstrek en aanvang van broedseizoen



Marc Guylt

- In Nederland overwinterende spreeuwen trekken weg.
- Om te broeden keren zij terug naar vaste broedplaatsen.
- Start nestbouw, duurt enkele dagen tot een week.
- Semi-koloniaal broedend in holtes in bomen en gebouwen, ook in nestkasten.
- Broedhabitat: vooral dorpen, steden en bos.
- Nestelen in holtes, gebouwen en nestkasten in de directe omgeving van foerageergebied/voedsel.



Smutterstock

Half april - juli
Broedseizoen



Philip Friskorn

- Meestal één legsel met 4 tot 6 eieren.
- Soms vervolglegsel.
- Voedsel volwassen vogels is veelzijdig: bodemfauna, vruchten, zaden en granen en menselijke voedselresten.
- Voedsel nestjongen: bodemfauna (vooral emelten) en insecten.
- Worden nog 4-5 dagen gevoed door ouders na uitvliegen.

VERVOLG KALENDER

Juni - november

Najaarstrek



- Een deel van de broedvogels trekt in de winter weg, maar blijft relatief dicht bij huis: België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. Uit noordelijke en oostelijke streken van Europa trekken grote aantallen spreeuwen door Nederland, waarvan een groot deel in ons land overwintert.
- Buiten het broedseizoen wordt het dieet veelal aangevuld met bessen.
- Habitat buiten broedseizoen: zowel stedelijke omgeving als agrarisch- en natuurgebied; buiten broedseizoen in (grote) groepen, en (vaak zeer) grote gezamenlijke slaapplekken.
- Najaarstrek van juni (jonge vogels) tot in november.

November - februari

Overwintering



- Buiten broedseizoen nauwelijks binding met het nest, maar vanaf januari worden potentiële nestplaatsen bezocht en wordt er soms in geslapen.

Inrichting

Beheer



- Er zijn diverse speciale nestkasten voor spreeuwen in de handel.
- Plaats bij voorkeur meerdere kasten bij elkaar aan gebouwen of bomen.
- Ophanghoogte 2-5 meter, aan gebouwen of bomen.

- Niet verwijderen van nestplaatsen. Spleten en gaten in gebouwen niet dichtmaken.
- Bij onderhoud aan bomen met nestholtes dient men voor vervangende nestgelegenheden te zorgen.
- In het najaar moet de nestkast schoongemaakt worden.

- Kort grasland met een rijk bodemleven - zo dicht mogelijk bij het nest - is belangrijk. In de regel binnen 500 meter.
- Zorg voor besdragende struiken.

- Gebruik geen gif. Emelten en andere bodemfauna in gazons en grasland kunnen met biologische bestrijding worden tegengegaan.
- Snoei buiten het broedseizoen in de winter en niet alles in hetzelfde jaar (maar om en om).



Zie ook maatregelfactsheet:

- Sportvelden
- Bermen en groenstroken
- Nieuwbouw
- Na-isolatie

Deze factsheet is mede tot stand gekomen met financiële steun van:



Barbara Eveline Keuning Stichting

Provincie Noord-Brabant

Wettelijke bescherming

De spreeuw is een beschermde soort. Nesten van spreeuwen zijn bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen of vernietigd worden. Een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteit van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. De spreeuw is door een aantal provincies onder de Omgevingswet aangewezen als soort die belangrijke schade veroorzaakt. In de relevante omgevingsverordeningen is vastgelegd welke maatregelen onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden gebruikt ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade door deze soort. Voor meer informatie, kijk op www.vogelsendewet.nl