

Merel

Broeden


Broedt van eind maart tot in juli. Heeft 2 legsels (soms 3) per broedseizoen, met elk 4-5 eieren. Broedduur: 11-15 dagen. Merels maken hun nesten in heggen, struiken en lage bomen. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen door katten en kraaien worden opgegeten. De jongen zitten 12-15 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 2-3 weken verzorgd door de ouders. Het liefst maken ze hun nest in dichte struiken of lage bomen en in klimop.

Leefgebied

Waar grasvelden zijn (hoe klein ook) en bomen en struiken, daar zijn merels. Merels zijn het meest te vinden in groene buitenwijken en in vochtige bossen met veel ondergroei.

Voedsel

Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.



Pimpelmees

Broeden


Broedt van eind maart tot in juli. Heeft in die periode 1-2 legsels met elk 7-13 eieren. Broedduur: 13-15 dagen. Pimpelmezen broeden behalve in boomholtes ook graag in nestkasten. De jongen zitten 18-21 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog zo'n 2-3 weken gevoerd.

Leefgebied

Pimpelmezen komen vooral voor in bosrijke gebieden met veel oude loofbomen. Daar broeden ze in boomholtes. Ze leven ook veel in dorpen en steden; ze broeden daar vaak in nestkasten. Pimpelmezen zijn veel te vinden in parken en tuinen, waar zij ook graag plekken bezoeken waar gevoerd wordt. 's Winters komen ze ook voor in rietkragen.

Voedsel

In broedtijd vooral insecten en hun larven (rupsen), spinnen en andere geleedpotigen. In de winter ook veel zaden (o.a. berk, lariks, haagbeuk, Spaanse aak); ze zijn dan veel te vinden op voedertafels (pinda's!). 's Winters ook in riet, op zoek naar insecten die uit de rietstengels worden gehakt. Foerageert vaak vrij hoog in de boom, op dunne takken en aan twijgen.



Koolmees

Broeden


Broedt vanaf eind april, heeft 1 of 2 legsels per jaar met elk 8-13 (soms 7-15) eieren. Broedduur 13-15 dagen. Broedt in holle bomen, maar maakt ook graag gebruik van nestkasten. Jongen zitten 18-21 dagen op het nest. Nadat ze zijn uitgevlogen, worden de jongen nog 2-3 weken gevoerd.

Leefgebied

Koolmezen komen vooral voor in bosrijke gebieden, maar ook in kleine bosjes, parken en tuinen, zo lang er voldoende nestgelegenheid en voedsel voorhanden is. Komt overal in Nederland voor, behalve in grote open gebieden zonder bomen en struiken.

Voedsel

Rupsen, kleine insecten, beukenootjes en andere zaden. Koolmezen zijn ook vaak te vinden op voedertafels, zeker wanneer pinda's en zonnebloempitten worden gevoerd.



Huismus

Broeden

Broedt van eind maart tot in augustus. De huismus heeft 2 tot 3 legfels per broedseizoen met elk 4-6 eieren. Broedduur: 11-12 dagen. Huismussen broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen. De jongen zitten zo'n 17 dagen op het nest. Als de jongen uitvliegen, worden ze daarna nog 1-2 weken gevoerd door de ouders.

Leefgebied

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus.

Voedsel

Het menu van de huismus bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda's en vetbollen. In broedtijd voornamelijk insecten.

Broeden

De spreeuw is een van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. Broedt van half april tot in juni. Heeft 1, soms 2 legfels met gewoonlijk 4-6 eieren. Broedduur: 11-13 dagen. Broedt graag met meerdere soortgenoten dicht bij elkaar in de buurt. De jongen zitten 19-24 dagen in het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog zo'n 4-5 dagen gevoerd.

Leefgebied

Spreeuwen broeden in holtes van bomen, in nestkasten en in gaten en kieren van gebouwen. Het zijn handige overlevers en je komt ze dan ook op veel plaatsen tegen, ook in dorpen en steden (bijvoorbeeld op stations). Ze zijn dol op grasvelden (van vochtig tot droog). Daar vinden ze veel voedsel.

Voedsel

Spreeuwen zijn alleseters, maar ze eten voornamelijk insecten en insectenlarven op grasvelden. In zomer, herfst en winter eten ze ook veel bessen en fruit, zoals appels.

Broeden

Broedt tussen midden maart en midden juli en kan 2 legfels hebben. Het aantal eieren varieert van 3 tot 5. Broedduur 10-14 dagen. Vinken zijn geen koloniebroeders. Het nest is van mos en gras gemaakt, bekleed met dierenhaar en veren. Goed verborgen tegen een tak of in een diepe struik. De jongen zitten 12-15 dagen op het nest. Na het uitvliegen blijven ouders en jongen nog 20-35 dagen bij elkaar.

Leefgebied

Komt voor in bossen, parken en tuinen, waar hij zowel een beschutte plaats om te broeden, als eten kan vinden.

Voedsel



Vinken eten voornamelijk zaden en zachte delen van planten. Vooral in het najaar scharrelen ze in grote groepen op de grond onder beuken naar beukennotjes, en in de tuin eten ze zaadjes die door andere vogels worden gemorst. Maar in het broedseizoen schakelen vinken over op insecten. In insecten zitten meer eiwitten en die zijn noodzakelijk voor de groei van de jongen en voor de drukke ouders die de jongen constant moeten voeren.



Spreeuw



Vink



Roodborst

Broeden

Broedt van april tot in juli. Heeft in die periode 2 legfels, met ieder 5-7 eieren. Broedduur: 12-15 dagen. Broedt in hopen, maar bouwt ook open nesten; laag boven de grond in een boom, muur of in dichte klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. De jongen zitten 13-15 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 2-3 weken verzorgd.

Leefgebied

Niet al te jonge bossen, tuinen, parken en landschappen met boompjes en struikjes. In de winter ook in stadstuinen.

Voedsel

Insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes, aangevuld met bessen en zaden. In de winter ook een vaak geziene gast op voedertafels. Zoekt voedsel hippend op de grond of vanaf zitplaatsen.



Heggenmus

Broeden

Broedt van eind april tot in augustus. Heeft jaarlijks 2, soms 3 legfels met elk 3-6 eieren. Broedduur 11-13 dagen. Het nest wordt zelden hoger dan 2 meter gemaakt in een heg of struik. De jongen zitten 11-13 dagen op het nest en worden 14-17 dagen na het uitvliegen door de ouders gevoerd.

Leefgebied

Heggenmussen hebben struiken en heggen nodig. Dat kan overal zijn: in bossen, houtwallen, tuinen, parken en kleinschalige landbouwgebieden. Ze komen bijna in het hele land voor. Het meest talrijk zijn heggenmussen in steden en dorpen, vooral in tuinen en parken.

Voedsel

Op het menu staan insecten, spinnen en andere kleine bodemdierjes die ze scharrelend op de grond bij elkaar zoeken. In de winter vullen zij dit aan met kleine zaden.



Grote bonte specht

Broeden


Broedt vanaf begin april. Heeft 1 legfel met meestal 5-7 eieren. Broedduur: 10-12 dagen. Het nest wordt een in zachte boomsoort uitgehakt, vanaf enkele meters hoogte aan te treffen. De jongen zitten 20-23 dagen in het nest. Als de jongen zijn uitgevlogen, worden ze nog max. 10 dagen gevoerd.

Leefgebied

Overal waar bomen zijn: in bos, park of tuin. Loofbossen en gemengde bossen met een diverse opbouw (jonge en oude bomen, dicht en open bos) zijn favoriet. Klimt over dikke takken of tegen de stam van een boom op, op zoek naar voedsel tussen de schors of de bast. Roffelt al vroeg in het voorjaar om zijn territorium veilig te stellen.

Voedsel

Ze eten in het voorjaar en de zomer insecten. In de wintermaanden dwalen ze rond op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht op voedertafels in tuinen. In naaldbossen eten ze 's winters de zaden van kegels van sparren en dennen.



Zanglijster

Broeden

De zanglijster broedt van eind maart tot in juli. Ze kunnen tot 3 legfels per jaar hebben met elk 3-6 eieren. Broedduur 12-14 dagen. Het nest wordt gemaakt op een slecht zichtbare plek laag in struiken en bomen. Hoe onopvallender hoe liever het de zanglijster is. Het bestaat uit takjes en vermolmd hout dat bekleed is met mos en/of gras; vanbinnen glad bepleisterd met modder. De jongen zitten 13-14 dagen op het nest. Na het uitvliegen worden ze ca. 2 weken gevoerd door de ouders.

Leefgebied

Struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden, dat is waar zanglijsters hun voedsel zoeken. Dichte, vochtige bossen zijn favoriet.

Voedsel

Het voedsel van de zanglijster bestaat uit regenwormen, insecten, duizendpoten, pissebedden en slakken. Foerageert vaak rennend en springend op het gras. De huisjes van slakken breken ze op vaste plekken open, de 'smidse'. Eet ook fruit zoals appels en bessen.



Winterkoning

Broeden

Broedt van half april tot in juli. Heeft 2 legfels per jaar, die bestaan uit 5-7 eieren. Broedduur: 13-15 dagen. Nest bolvormig met veel mos, met aan de zijkant een opening. Het mannetje maakt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteindelijk 1 nest uitkiest om in te broeden. De jongen zitten 15-19 dagen op het nest en worden tot 18 dagen na uitvliegen nog gevoerd door beide ouders.

Leefgebied

De winterkoning komt in het hele land als broedvogel voor. Overal waar genoeg dekking is om een nest te kunnen bouwen. Als er voldoende groen aanwezig is, komt de winterkoning voor tot in de centra van grote steden. Ze zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas, meestal op of laag boven de grond.

Voedsel

Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en ook zaadjes. Ook uit smalle spleten in bijvoorbeeld schors kunnen ze allerlei eiwitrijk gedierte peuten.



Boomklever

Broeden

Ze leggen 1-2 keer eieren vanaf april met meestal 6-9 eieren. Boomklevers broeden vaak in oude spechtennesten, waarvan ze de ingang met modder precies op maat maken. De bodem van het nest wordt bedekt met schilfers dennenschors en dode blaadjes. Ze broeden ook in nestkasten. Boomklevers broeden vaak meermaals in hetzelfde nest.

Leefgebied

Boomklevers leven graag in oudere bossen met veel verschillende soorten loofbomen. Ook in parken en tuinen zijn ze te vinden.

Voedsel

Voedsel zoeken boomklevers door nauwkeurig de schors van bomen te inspecteren op insecten. Ze eten ook zaden en noten; die zetten ze vast tussen de bast van een boom, of ze houden ze vast in hun poot, en pikken ze dan kapot met hun krachtige snavel. Vaak te vinden op voedertafels.